

## 1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION

Code Masse d'eau	Libellé	Typologie	Surface du bassin-versant (km <sup>2</sup> )	Longueur du bras principal (km)
FRLR08	Rivière du Mât aval	Cirques au vent -couloir	16	13

La masse d'eau FRLR08 correspond au tronçon aval de la Rivière du Mât. Elle est située à l'aval de la masse d'eau FRLR07. Son bassin-versant est principalement agricole, mais il comprend également les zones urbaines de Saint-André.

La masse d'eau se rejette dans la mer sur les communes de BRAS PANON et de SAINT ANDRE par une large embouchure. Des zones d'infiltration viennent alimenter l'aquifère littoral du Planèze Nord.

### Registre des zones protégées

Sans objet

### Points de surveillance de la qualité de la masse d'eau

Un réseau de surveillance, mis en œuvre par l'Office de l'Eau de La Réunion, permet de suivre la qualité de la masse d'eau. Les données sont facilement consultables sur le site Internet : <http://www.reunion.eaufrance.fr>

#### Liste des sites de surveillance de FRLR08


Intitulé du site	Code Site	Éléments de qualité suivis
Rivière du Mât Bengalis	10220110	Éléments biologiques, DCE
Rivière du Mât Pont RN2	10220145	Éléments biologiques, DCE
Rivière du Mât Embouchure (Bras de Pierre)	10220180	Éléments biologiques, DCE

## 2. EVALUATION DES PRESSIONS ET DES IMPACTS

### A. OCCUPATION DU SOL : ESPACES URBAINS, ESPACES AGRICOLES, ESPACES NATURELS

Sur le bassin-versant de la masse d'eau FRLR08, l'urbanisation se regroupe autour de 3 pôles principaux constitués par les communes de Salazie, Saint-André et Bras-Panon. Ce bassin-versant est majoritairement occupé par des espaces agricoles et par le bourg de Bengalis et quelques quartiers Sud de Saint-André. Sur ce secteur, l'agriculture est dominée par la canne à sucre et l'arboriculture.

Répartition des espaces urbains, agricoles et naturels sur FRLR08 (source Corin Land Cover 2006)



**B. PRELEVEMENTS****Estimation d'un bilan des prélèvements en 2011 à l'échelle de la masse d'eau**

Prélèvements		Année
Prélèvements superficiels pour l'irrigation sur le sous bassin versant	509 732 m³/an	2011
Prélèvements superficiels pour l'industrie sur le sous bassin versant	69 190 m³/an	2011
Prélèvements superficiels pour les ENR/recharge de nappe sur le sous bassin versant	m³/an	2011
Prélèvements superficiels pour l'eau potable sur le sous bassin versant	m³/an	2011
<b>Total des prélèvements superficiels sur le sous bassin versant</b>	<b>578 922 m³/an</b>	2011
<b>Taux de restitution après le prélèvement le plus important</b>	<b>94%</b>	

Sources :

Prélèvements estimés à partir des redevances Office de l'Eau - 2011

Taux de restitution en période d'étiage estimé en 2009 dans le cadre de l'étude « Caractérisation et quantifications des impacts ayant une incidence sur les peuplements de poissons, de macrocrustacés et de macroinvertébrés dans les rivières de l'île de La Réunion » (ARDA, K. RUFFIE, 2010)

En 2009, le débit restitué à l'aval des ouvrages a été estimé à 94% du débit amont en période d'étiage ( ARDA, 2010 ). Sur cette base, il est estimé que les prélèvements d'eau exercent une pression faible sur le régime hydraulique du cours d'eau, sans impact significatif sur la qualité de la masse d'eau.

**Évolution prévisionnelle des prélèvements**

L'évolution future de la demande en eau potable est difficile à évaluer car elle dépendra principalement des facteurs suivants : l'évolution démographique et la répartition spatiale des nouveaux habitants, l'évolution des habitudes de consommation, et le renouvellement des réseaux de distribution.

Il est à noter que la mise en service des prélèvements ILO sur les masses d'eau situées en amont ( FRLR05) est susceptible d'avoir un impact significatif sur la qualité écologique de FRLR08. L'arrêté préfectoral autorisant ces prises d'eau a néanmoins prévu le maintien d'un débit réservé et la mise en place d'un suivi hydrobiologique du cours d'eau en aval des prises pendant 5 ans. Un étude est en cours sur la détermination d'un débit minimum biologique.

**C. OBSTACLES A LA FRANCHISSABILITE**Obstacles principaux sur le bassin-versant

Ouvrages	Commentaires
Seuil de Bengalis	Pression jugée très forte sur la montaison des espèces ( barrière infranchissable sur 3 groupes d'espèces). Impact significatif. Nécessité d'une poursuite de réflexion sur le devenir du barrage. Action prioritaire compte tenu de l'importance du linéaire d'habitat colonisable en amont de l'ouvrage.

Source : Évaluation de la continuité écologique sur les 13 rivières pérennes de La Réunion - DEAL 2010, OCEA 2013

**D. PRESSIONS POLLUANTES PONCTUELLES ET DIFFUSES****PRESSIONS URBAINES****Évaluation de la pression ponctuelle liée à l'assainissement collectif en 2011**

Source : Base de Données sur les Eaux Résiduaires Urbaines (2010 – 2011)

Sur le bassin-versant de la masse d'eau FRLR08, l'urbanisation se regroupe autour de 3 pôles principaux constitués par les communes de Salazie, Saint-André et Bras-Panon, équipées en partie d'un réseau d'assainissement collectif.

- A Bras-Panon, la station d'épuration est en surcharge. Des travaux d'extension sont prévus afin de disposer d'un ouvrage de traitement satisfaisant. Le point de rejet se situe sur le quartier de Ma Pensée avec une infiltration près de l'Océan . Il ne présente pas d'impact sur la qualité du cours d'eau.

- Concernant les réseaux collectifs, ils sont majoritairement de type séparatif. Sur ces réseaux, plusieurs dysfonctionnements peuvent générer une pression non négligeable sur les milieux aquatiques : raccordements mal effectués, exutoires directs d'eaux usées, sous-dimensionnements de postes de relèvement et de déversoirs d'orage ... Ainsi, d'importants débits d'eaux parasites peuvent impacter la qualité des milieux aquatiques. Cette pression est difficile à quantifier en l'absence de plans de réseaux digitalisés à l'échelle de l'île permettant d'identifier les points de rejets directs, et de localiser les postes de refoulement et les déversoirs d'orage.

L'appréciation de la pression liée à l'assainissement collectif s'est appuyée uniquement sur les rejets de station d'épuration collective.

Cette pression est considérée comme faible, sans impact significatif sur l'état de la masse d'eau.

### **Pression liée à l'assainissement autonome**

À la Réunion, le taux de non conformité des installations autonomes est important et il est estimé à 70 %.

Les dispositifs mis en place privilégient les rejets dans le sol (parfois par puits perdus), et ils sont donc susceptibles de contribuer prioritairement à la dégradation de la qualité des eaux souterraines. Cependant, le ruissellement vers les eaux de surface est également envisageable pour partie, avec alors un impact possible sur la qualité des cours d'eau et des eaux côtières.

En première approche, il est proposé d'évaluer la pression diffuse liée à l'assainissement individuel sur la base du nombre d'habitants rattachés à l'assainissement autonome et d'une évaluation des quantités annuelles d'azote émis par ces dispositifs.

Masse d'eau	Population en assainissement autonome	Azote émis (kg NH <sub>4</sub> /km <sup>2</sup> )	Teneurs en nutriment dans le cours d'eau
FRLR08	6 400 hab	1300	Bon état en nutriments

En terme d'impact, il s'agit de quantités émises au droit des sols, et non rejetées directement dans la masse d'eau. Il est difficile de quantifier les flux azotés "résiduels" pouvant aller vers la masse d'eau du fait notamment de la présence de phénomènes de "nitrification et dénitrification", de l'évaluation de la part qui relève de l'infiltration et du ruissellement, et des phénomènes de transfert des nitrates difficiles à appréhender.

Néanmoins, les teneurs en nutriments observées dans le milieu ont été prises en compte comme indicateur d'un impact potentiel.

Cette pression est considérée comme forte, sans impact significatif sur l'état de la masse d'eau.

### **Pression diffuse liée au ruissellement des eaux pluviales**

La surface imperméabilisée (surface active) sur la bassin-versant est estimée à 136ha soit 8,3 % du bassin versant. La pression est considérée comme modérée. Les éléments de connaissance ne permettent pas de quantifier l'impact de la pression liée au ruissellement d'eaux pluviales sur la masse d'eau.

### **Analyse pression-impact des pollutions domestiques urbaines**

Concernant les rejets d'assainissement domestique (collectifs ou individuels), les pressions exercées sont susceptibles de provoquer un enrichissement artificiel des eaux en nitrates et phosphates qui se traduisent par des phénomènes d'eutrophisation. Ces pollutions sont parfois accompagnées de matières organiques, de macrodéchets et de bactéries fécales selon que les rejets sont ou pas connectés aux réseaux d'assainissement, et selon les performances réelles d'abattement des charges par les stations d'épuration.

Sur la rivière du Mât aval, aucun phénomène d'eutrophisation n'a été observé et la masse d'eau est en bon état vis à vis du paramètre "nutriments" au titre de la Directive Cadre sur l'Eau.

Cependant, le suivi des germes tests de pollution fécale par l'Office de l'Eau en 2010 montre une situation peu favorable, avec un cours d'eau concerné par une contamination bactériologique, dont l'origine peut être liée aux pollutions domestiques urbaines, à l'utilisation mal maîtrisée de fertilisants d'origine organique en agriculture ou à la gestion d'effluents d'élevages.

La Directive Cadre sur l'Eau ne prenant pas en compte cette contamination comme un indicateur de qualité, et considérant le bon état en nutriments dans le cours d'eau au regard des seuils de qualité issus de la Directive Cadre sur l'Eau, l'impact est considéré comme non significatif sur l'état de la masse d'eau.

**Perspectives d'évolution des pressions urbaines d'ici 2021**

Une tendance d'évolution de la population à la hausse à l'échelle de l'île :

A l'échelle de l'île, dans les 30 ans qui viennent, à l'horizon 2040, la population réunionnaise devrait augmenter de 27 % (taux d'accroissement annuel de 1,2 %). Il est difficile d'anticiper son évolution à l'échelle de la masse d'eau.

Evolution de l'assainissement collectif et autonome :

L'assainissement collectif va être considérablement amélioré par les travaux d'extension de la station d'épuration de BRAS PANON (avec rejet en mer).

La création et l'extension des réseaux de collecte des eaux usées, prévues dans le programme de mesures du SDAGE 2010-2015 et initiées par les collectivités, devraient contribuer à une évolution à la baisse de la pression potentielle liée aux dispositifs d'assainissement autonome, malgré une densification de l'habitat et un étalement urbain prévisibles compte-tenu de l'augmentation de la population.

La mise en place des Services Publics d'Assainissement Non Collectifs (SPANC) devrait contribuer à une amélioration du diagnostic individuel de ces dispositifs.

Pour les propriétaires, la réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif constatés comme défectueux n'est rendue obligatoire que dans les zones à enjeu sanitaire (périmètres de protection rapprochés ou éloignés de captage d'eau potable, et secteurs identifiés dans les profils de baignade) ou dans les zones à enjeu environnemental définies par le SDAGE ou les SAGEs. Le SDAGE actuellement en vigueur n'ayant pas procédé à l'identification de zones à enjeu environnemental, il est peu probable de s'attendre à une amélioration de la pression potentielle des dispositifs défectueux.

L'aménagement et les grands projets :

Les nouveaux projets d'aménagements intègrent les enjeux liés à l'eau (dossier loi sur l'eau avec gestion des écoulements et des eaux pluviales) et proposent des mesures réductrices ou compensatoires vis à vis des effets sur les masses d'eau impactées. L'impact des nouveaux projets sur la masse d'eau est réduit au minimum.

Voici la liste des projets principaux concernant la masse d'eau et ayant un impact potentiel direct :

Nom	Type	Commune	Impact potentiel sur la masse d'eau
Réparation de l'ouvrage d'Art sur la Rivière du Mât	Aménagement routier	Saint-André/Bras-Panon	Impact éventuel phase travaux
TCSP Cirest	Aménagement routier	Saint André/Bras Panon	Impact éventuel phase travaux

Source : DEAL 2012 et SAFEGE 2013

**PRESSIONS INDUSTRIELLES**

Concernant les installations industrielles et alimentaires classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en activité et soumises à autorisation, le tableau suivant présente les domaines d'activité concernés et une évaluation de la pression potentielle de ces sites sur la qualité de la masse d'eau :

Activité	Nombre de sites	Rejets	Impact sur la masse d'eau	RSDE*
Activité de matériaux	3	Peu de rejets d'eau de procédé	Les activités d'extraction sont susceptibles de perturber la qualité écologique du milieu. Cependant, les risques sont limités et les installations autorisées mettent en œuvre des dispositions pour limiter tout impact environnemental.	non

\* RSDE : Campagne de recherche de substances dangereuses dans les eaux de rejet

Source : DEAL, 2012

### **Anciennes décharges :**

2 anciennes décharges ont été identifiées sur le bassin-versant. Les opérations de réhabilitation sont en cours. Pas d'impact significatif sur la qualité de la masse d'eau.

**Sites et sols pollués** : pas de sites et sols pollués identifiés sur le bassin-versant.

### **Autres pressions potentielles liées aux activités industrielles**

Des pollutions ponctuelles ou diffuses liées aux activités industrielles non classées pour la protection de l'environnement et aux zones d'activité peuvent être émises.

Il peut s'agir de rejets ou de dépôts de déchets polluants non soumis à déclaration (fûts d'hydrocarbures, gravats, déchets divers...). Ces pressions ne peuvent pas être connues précisément.

### **Perspectives d'évolution des pressions industrielles d'ici 2021**

L'évolution des activités industrielles n'est pas prévisible dans le temps. Si de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement venaient à s'implanter sur le territoire, les procédures d'autorisation préfectorale permettent de s'assurer d'un impact peu significatif.

### **Analyse pression-impact**

Sur FRLR08, l'impact de la pression industrielle est considérée comme non significatif.

## **PRESSIONS AGRICOLES**

### **Pression diffuse liée à l'usage des pesticides**

#### **Évaluation de la pression à l'échelle du bassin versant**

La pression liée à l'usage des pesticides peut être d'origine agricole et non agricole.

En zone urbaine, l'usage des pesticides peut présenter une pression potentielle sur la qualité de l'eau : entretien de voiries, gestion des espaces verts, utilisation par les jardiniers amateurs. Les quantités de pesticides utilisées pour les activités non agricoles, de même que les pratiques des utilisateurs de ces produits en matière de dosage, d'équipement de protection, de stockages des produits et des déchets, sont peu connues. Cette pression est difficilement quantifiable par manque de données à La Réunion. Elle n'a donc pas pu être évaluée.

Néanmoins, une étude réalisée par l'Office de l'Eau en 2009 a estimé que l'agriculture utilise 93% des quantités de produits pesticides importés à La Réunion en 2009. ("*Etat des lieux des usages et de la présence des pesticides dans les eaux douces et marines de La Réunion*", Office de l'Eau, 2009)

Concernant le volet agricole, un indice de pression potentielle phytosanitaire (IPP) a été affecté aux différentes familles de cultures en fonction des doses et pratiques. Ce coefficient a fait l'objet d'un dire d'expert, dans l'attente du développement de l'indice de fréquence de traitement.


Familles de cultures	IPP régional par famille de cultures
----------------------	--------------------------------------

## FRLR08 : Rivière du Mât aval

Canne à sucre	3,3
Maraîchage plein champs	28
Arboriculture fruitière	6
Horticulture plein champs	45
Prairies temporaires	1
Prairies permanentes	0

Sur FRLR08, la SAU représente 39 % du bassin-versant de la masse d'eau. Sur ce secteur, l'agriculture est dominée par la canne à sucre (93 % de la SAU)

Répartition des coefficients de pression pesticide sur le bassin versant FRLR008 (source : RA 2010)



La pression pesticides présente un IPP moyen de 1,29

Cette pression est modérée.

### Perspectives d'évolution de la pression

L'évolution de la Surface Agricole Utile n'est pas prévisible dans le temps. Cependant, d'ici 2021, la mise en œuvre du plan EcophytoDOM et le déploiement des mesures agri-environnementales devraient contribuer à de meilleures pratiques et une limitation du volume des produits phytosanitaires utilisés à l'échelle de l'île.

### Analyse de la relation "pression-impact"

L'analyse « pression-impact » de l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture comporte de nombreuses difficultés du fait de la diversité des caractéristiques intrinsèques des molécules utilisées, de la nécessité de prise en compte des produits de dégradation, de la variabilité spatiale et temporelle des applications, des propriétés d'infiltration des sols, de l'aménagement du territoire (zones tampon, topographie, etc.), et de la difficile appréciation des pratiques agricoles et non agricoles.

Sur FRLR08, la pression est modérée et la présence de pesticides est fréquemment détectée sur les stations suivies par l'Office de l'Eau ( cf. *Synthèse annuelle Office de l'Eau 2010* ). Il convient donc d'être vigilant vis à vis de cette pression, notamment pour un usage à long terme de la ressource en eau pour la distribution d'eau potable.

Concernant les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau, les valeurs mesurées ne remettent pas en cause le bon état chimique du cours d'eau. La relation pression-impact vis à vis de l'état écologique des espèces réunionnaises est méconnue. Compte tenu des valeurs mesurées, l'impact est considéré comme non significatif.

### Pression diffuse liée à la fertilisation azotée et phosphatée

L'azote : Les quantités d'azote mobilisées et liées à la fertilisation des sols sont actuellement difficilement quantifiables à partir des données existantes.

Le phosphore : La pression liée au phosphore en agriculture à La Réunion n'a pas fait l'objet d'études jusqu'à présent. La problématique est très peu connue, notamment la capacité des sols réunionnais à mobiliser le phosphore.

### Analyse pression-impact

Il est difficile de quantifier les flux azotés pouvant atteindre les cours d'eau et de faire la part entre la pression potentielle d'origine agricole (lié à une éventuelle surfertilisation des sols) et d'origine urbaine (lié aux dispositifs d'assainissement autonome).

La pression potentielle est donc appréhendée au regard de l'importance de l'assolement agricole sur le bassin-versant, et l'impact en prenant en compte les teneurs en nutriments observés et les seuils issus de qualité de la Directive.

### FRLR08 : Rivière du Mât aval

Masse d'eau	Pression agricole	Teneurs en nutriment dans le cours d'eau	Impact
FRLR08	Forte	Bon état en nutriments au titre de la Directive Cadre sur l'Eau	Impact non significatif

Cependant, le suivi des germes tests de pollution fécale par l'Office de l'Eau en 2010 montre une situation peu favorable, avec un cours d'eau concerné par une contamination bactériologique, dont l'origine peut être liée aux rejets d'eaux usées domestiques (dysfonctionnement des dispositifs d'assainissement autonome), à un défaut d'épandage de fertilisant d'origine organique ou à une mauvaise gestion d'effluents d'élevage.

#### **Pressions liées à la présence et à la gestion des effluents d'élevages**

Le cheptel en place a été estimé à partir des données du Recensement Agricole 2010 et il a été ramené au pourcentage de cheptel présent sur le bassin-versant par rapport à l'ensemble de l'île.

Bovins ( UGB)	Porcins (UGB)	Volailles (UGB)	Évaluation de la pression vis à vis du cheptel total de La Réunion
0%	3,9%	2,69%	Pression faible

En l'état des connaissances, il n'a pas été possible d'estimer les flux polluants générés par les élevages à l'échelle des masses d'eau, de modéliser les phénomènes de transfert de ces flux vers les eaux de surface ou vers les eaux souterraines, et d'évaluer la relation potentielle « pression-impact » des élevages sur la qualité des masses d'eau.

Cependant, le suivi des germes tests de pollution fécale par l'Office de l'Eau en 2009 et 2010 montre une situation peu favorable, avec un cours d'eau concerné par une contamination bactériologique, dont l'origine peut être liée aux rejets d'eaux usées domestiques (dysfonctionnement des dispositifs d'assainissement autonome), à un défaut d'épandage de fertilisant d'origine organique ou à une mauvaise gestion d'effluents d'élevage.

La Directive Cadre sur l'Eau ne prenant pas en compte cette contamination comme un indicateur de qualité, et considérant le bon état en nutriments dans le cours d'eau vis à vis des seuils de qualité issus de la Directive Cadre sur l'Eau, l'impact est considéré comme non significatif sur la masse d'eau.

## **E. AUTRES PRESSIONS**

### **PÊCHE**

#### **Pêche aux bichiques en canaux à l'embouchure**

La pêche aux bichiques est très ancrée à La Réunion.

Sur cette rivière, 2 groupements de pêcheurs sont recensés : la Fédération des pêcheurs de la rivière du Mât et l'association Protection de la Pêche et de l'Environnement, regroupant plus de 60 pêcheurs. Des pêcheurs occasionnels sont ponctuellement observés en amont de la limite de salure des eaux lors de fortes remontées de bichiques.

Les modalités de cette pêche, encadrées par l'arrêté du 15 juillet 2008, ne sont pas ou peu respectées, notamment l'obligation de laisser libre un chenal de 2m, qui a pour objet de permettre la colonisation du cours d'eau par une partie des post-larves (le cours d'eau est l'habitat de croissance et de reproduction pour les deux espèces majoritaires capturées sous l'appellation de bichiques : *S. lagocephalus* et *C. acutipinnis*).

L'impact de cette pêcherie sur le cycle de vie des autres espèces de poissons et de macro-crustacés est difficile à évaluer. Dans le cadre de l'étude continuité écologique réalisée en 2010 par la DEAL, seules les espèces cibles (bouches-rondes *S. lagocephalus* et *C. acutipinnis*) ont été jugées impactées même s'il est fortement supposé que les aménagements des pêcheries pourraient impacter l'ensemble des espèces diadromes (obstacle à la libre circulation, pertes d'habitats).

Cette pression est considérée comme très forte, avec un impact significatif sur l'état écologique de la masse d'eau.

#### **Pêche en eau douce réglementée**

La rivière du Mât aval est très régulièrement fréquentée par les pêcheurs compte tenu d'une part de son accessibilité et de sa proche situation de grands centres urbains. Les espèces principalement recherchées sont les anguilles et les

crustacés, mais aussi le poisson plat et le mulot dans la limite de colonisation de ces espèces (barrage de Bengalis pour de nombreuses espèces autorisées à la pêche).

La pression exercée par la pêche réglementée y est forte.

La pratique de la pêche fait l'objet d'un arrêté préfectoral encadrant les modalités de pêche autorisées, les périodes et les espèces prélevables. Cet arrêté est révisé annuellement. Dans ce contexte, l'impact de cette pratique de pêche réglementée est considéré comme non significatif sur l'état écologique des masses d'eau.

### **Braconnage**

Parallèlement aux activités de pêche autorisées et encadrées par la Fédération de Pêche et des Milieux Aquatiques, la pratique du braconnage reste significative et a des impacts réels, bien que mal connus. Il se pratique sur tous les cours d'eau et notamment dans les zones d'embouchures, qui sont les plus riches.

Les impacts du braconnage peuvent être particulièrement lourds lorsque des produits toxiques sont employés ou lorsque des bras vifs de rivière sont déviés (pêche par assèchement). Malgré l'action des gardes-pêches (Fédération de Pêche et AAPPMA) et de la Brigade de la Nature de l'Océan Indien (BNOI), plusieurs fois par an des pollutions « volontaires » sont commises dans les différentes rivières de l'île.

Le braconnage porte également sur le non respect des contraintes imposées par l'arrêté de pêche en eau douce que ce soit sur les limitations d'engins (nombre de lignes pour l'anguille), les tailles de captures, ou le non-respect des périodes de fermetures.

Cette pression est considérée comme forte.

### **Évolution prévisionnelle de la pratique de la pêche**

Compte tenu des efforts engagés par la Fédération de Pêche et l'AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Rivières du Nord) pour accompagner les braconniers vers des pratiques légales et des contrôles mis en place sur le terrain, la pression de braconnage devrait être amenée à diminuer.

### **ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE**

La pratique d'activité d'eau vive ou de pleine nature est exercée sur ce bassin-versant. Il s'agit de canyoning, de kayak ou de rafting. Les clubs sont peu nombreux mais comptent une certaine affluence en période touristique. L'exercice de telles activités peut avoir un impact sur la qualité des cours d'eau. En effet, la flore et la faune aquatique sont exposées à des piétinements voire à des arrachements dus aux frottements des coques des embarcations contre le sol ou autre milieu naturel (vase, roche...).

La fréquentation de ces sites n'est pas documentée.

## **3. ETAT CHIMIQUE**

Au regard des substances caractéristiques de l'état chimique surveillées et conformément aux règles d'évaluation de l'état des eaux au titre de la Directive Cadre sur l'Eau, aucune substance caractéristique de l'état chimique suivie n'a été identifiée comme dépassant les normes de qualité environnementales (en concentration moyenne annuelle ou en concentration maximale admissible)

État chimique : **Bon**  
Indice de confiance : **Faible**

## **4. ETAT ECOLOGIQUE**

### **Éléments de qualité biologique**

Code site	Nom du site de surveillance	État biologique	Poissons	Invertébrés	Diatomées
10220110	Rivière du Mât Bengalis	Très bon			
		Bon			
		Moyen	x		



**FRLR08 : Rivière du Mât aval**

10220145	Rivière du Mât Pont RN2	Médiocre			
		Mauvais			
		Très bon			x
		Bon			
		Moyen			
		Médiocre			
10220180	Rivière du Mât Embouchure (Bras de Pierre)	Mauvais			
		Très bon	x		
		Bon			
		Moyen		x	
		Médiocre			
		Mauvais			

**Éléments de qualité physico-chimique**

Code site	Nom du site de surveillance	État physico-chimique	Bilan d'oxygène	Nutriments	Acidification	Salinité
10220145	Rivière du Mât Pont RN2	Très bon	x			Non suivi
		Bon		x	x	
		Moyen				
		Médiocre				
		Mauvais				

**Polluants spécifiques de l'état écologique**

État	Polluants spécifiques de l'état écologique			
	non synthétiques	synthétiques	conclusion	Molécules dégradantes
Très Bon	Inconnu	Très Bon	Très Bon	sans objet
Mauvais				

**Évaluation de l'état écologique agrégé à partir des règles d'évaluation de l'état des eaux**

État écologique : **Moyen** - Paramètre déclassant : biologie, poisson  
 Indice de confiance : **Moyen**

**FRLR08 : Rivière du Mât aval**  
**Fiche de synthèse – FRLR08**

Code Masse d'eau	Libellé	Typologie	Surface du bassin-versant (km2)	Longueur du bras principal (km)
FRLR08	Rivière du Mât aval	Cirques au vent -couloir	16	13

	État	Paramètre en cause	Niveau de confiance
État chimique	Bon	Sans objet	Faible
État écologique	Moyen	Qualité biologique	Moyen

Pressions	Sources de pressions	Évaluation des impacts	Scénario tendanciel 2021	
		Impact	Scénario	Commentaires
Ponctuelles significatives (SWPI3)	Stations d'épuration	Pas de pression identifiée		
	Installations industrielles	Non significatif		
	Autres sources significatives	Pas de pression identifiée		
Diffuses significatives (SWPI4)	Population non raccordée au réseau d'eaux usées	Non significatif	↘	Mise en place de SPANC, extension des réseaux collectifs
	Eaux de ruissellement urbain	Inconnu	↗	Densification de l'urbanisation
	Activités agricoles	Non significatif	↘	Mise en œuvre du plan Ecophyto
Prélèvements significatifs (SWPI5)	Agriculture	Non significatif	↗	Mise en service des prises ILO sur la masse d'eau amont FRLR05
	Production d'eau potable	Pas de pression identifiée	-	
	Activité industrielle	Non significatif		
	Activités hydro-électriques	Pas de pression identifiée		
	Carrières	Pas de pression identifiée		
	Transferts d'eau	Pas de pression identifiée		
	Autres prélèvements significatifs	Pas de pression identifiée		
Altérations morphologiques (SWPI6)	Altérations physiques des chenaux	Significatif	?	Seuil de Bengalis
	Infrastructures routières en phase travaux	Pas de pression identifiée		
	Barrages hydroélectriques	Pas de pression identifiée		
Autres pressions (SWPI7)	Pêche en eau douce	Non significatif		
	Pêche aux bichiques	Significatif	↘	Site pilote
	Braconnage	Significatif	↘	Police de la pêche
	Activité de pleine nature	Inconnu		

Pressions cause de risque	Altérations physiques des chenaux
	Pêche aux bichiques
	Braconnage

Risque de non atteinte des objectifs environnementaux		Oui/Non
RNAOE	RNAOE - État chimique	Non
	RNAOE - État écologique	Oui
	RNAOE global	Oui