

1. IDENTIFICATIONS ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

La masse d'eau FRLC109 correspond à la masse d'eau récifale située dans le Sud de l'île de La Réunion, sur la commune de Saint-Pierre.

Dans sa partie terrestre, elle possède une aire d'alimentation d'une surface totale de 71 km² parcourue par aucun cours d'eau dont le milieu récepteur final est FRLC109.

Pour sa composante marine, sa superficie est de 3,14 km² pour un linéaire côtier d'environ 4 km. C'est une masse d'eau récifale (MER) de type 5 caractérisée par des fonds coralliens, une bathymétrie faible (limitée sur la pente externe à 25m), une hauteur moyenne de vague moyenne à forte et une exposition aux houles moyenne pour la houle australe mais faible concernant les houles cycloniques (Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012).

A noter que cette masse d'eau est dans le périmètre des zones désignées comme sensibles dans le cadre de la directive 91/271/CEE sur les eaux résiduaires urbaines.

2. RESEAU DE CONTROLE SURVEILLANCE (RCS)

Avant mi-2012, la DCE était sous maîtrise d'ouvrage de la DEAL et seul le suivi « hydrologie - phytoplancton » (RHRL – Réseau Hydrologique du Littoral Réunionnais) était mis en œuvre à la Réunion. Les autres suivis du RCS ont été définis dans le cadre du projet « Bon État II » en s'appuyant sur plusieurs études et en partenariat avec les experts locaux (ARVAM, ECOMAR, GIP RNMR, IFREMER, IRD et PARETO) et nationaux.

Depuis mi 2012, la DCE est sous maîtrise d'ouvrage de l'Office de l'Eau Réunion et les différents suivis RCS sont déployés progressivement – chacun des suivis sera mené au moins une fois avant 2015.

Liste des sites de surveillance de FRLC109

Libellé du site	Mmémorisation Q ² du site	Éléments de qualité suivis
La Ravine Blanche (Pente externe)	126-P-037	État écologique État biologique (Benthos de substrats durs)
Alizé Plage (Pente externe)	126-P-039	État écologique État biologique (Benthos de substrats durs)
Lagon Saint-Pierre- Ravine Blanche	126-P-013	État écologique État physico-chimique État chimique

3. ETAT CHIMIQUE

Au regard des substances caractéristiques de l'état chimique surveillée et conformément aux règles d'évaluation de l'état des eaux au titre de la Directive Cadre sur l'Eau, l'état chimique n'a pu être évalué. Le suivi des contaminants chimiques du « Réseau de Contrôle Surveillance » (RCS) sera mis en œuvre pour la 1ère fois en 2014-2015 dans le cadre du plan de gestion 2010-2015.

Plusieurs études ont cependant été menées ces dernières années :

- 2008/2009 – PEPS – Pré-étude Échantillonnage Passif pour la Surveillance de la contamination chimique,
- 2004/2008 – MODIOLE – Transfert de la technologie RINBIO (Réseau INTégrateur BIOlogiques) – Biomonitoring actif à la Réunion,
- 2012 – Campagne exceptionnelle ONEMA – Suivi des contaminants chimiques par échantillonneurs passifs (résultats attendus en 2013).

État chimique : **INCONNU**
 Indice de confiance : **PAS D'INFORMATION**

État chimique par famille de paramètres

% de paramètres en :	Famille de paramètres				41 substances (toute famille confondue)
	Pesticides	Polluants industriels	Métaux lourds	Autres polluants	
Bon Etat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mauvais État	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Etat inconnu (non suivi)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
État chimique	Inconnu				

Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012

4. ETAT ECOLOGIQUE

L'état écologique des eaux côtières au titre de la Directive Cadre sur l'Eau résulte de la combinaison des états biologique, physico-chimique et hydromorphologique.

A. ELEMENT DE QUALITE HYDROMORPHOLOGIQUE

Cet indicateur de qualité sera mis en œuvre sur la base méthodologique définie au niveau national par le BRGM. Pour les eaux réunionnaises, le BRGM local a programmé l'évaluation de l'état hydromorphologique d'ici la fin de l'année 2013. L'absence de donnée contraint actuellement à le définir comme inconnu.

État hydromorphologique	Régime	Continuité	Condition
Très bon			
Moins que très bon			
Non défini			
Non pertinent			
État hydromorphologique	Inconnu		

Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012

B. ELEMENT DE QUALITE BIOLOGIQUE

L'échantillonnage du phytoplancton dans les Masses d'Eau Récifales (MER) est considéré comme non pertinent par le GT "physico-chimie et phytoplancton" DCE de la Réunion. De nombreuses sources de variabilité de ce paramètre liées au broutage du phytoplancton par les organismes benthiques, à l'intensité lumineuse très forte, à la faible profondeur, entraînent une dégradation rapide de la chlorophylle *a*, ainsi qu'une remise en suspensions du microphytobenthos par l'hydrodynamisme local (vent, houles, marée, ...).

Dans les masses d'eau côtières, le benthos de substrats meubles est l'indicateur qualifié alors que dans les masses d'eau récifales, le benthos de substrats durs est désigné.

La mise en œuvre d'un réseau de contrôle de la surveillance dédié au "Benthos de Substrat Durs" constitue, en 2012, une démarche nouvelle ne pouvant s'adosser sur aucune expérience similaire en métropole et dans les autres DOM : l'évaluation s'appuie sur les données de suivi des pentes externes acquises entre 2006 et 2011 dans le cadre du suivi GCRMN de la Réserve National Marine de la Réunion (RNMR).

État biologique	Phytoplancton			Benthos de substrats meubles	Benthos de substrats durs
	Biomasse	Abondance	Composition		
Très bon					
Bon					
Moyen					
Médiocre					
Mauvais					
Non défini		*	*	*	
Non pertinent					
État biologique	Bon				

Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012 / * Indicateur non défini

C. ELEMENT DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

L'évaluation des éléments physico-chimiques est réalisée sur les données bancarisées à la date du 30/06/2012 complétées des données acquises en 2010, 2011 et 2012 dont la bancarisation est prévue d'ici fin 2013. Pour la majorité des masses d'eau, la quantité de données disponibles est équivalente à celles devant être acquises sur un plan de gestion de 6 ans.

État physico-chimique	Température	Oxygène dissous	Nutriments	Salinité	Transparence
Très bon					
Bon					
Moyen					
Médiocre					
Mauvais					
Non défini					
Non pertinent					
État physico-chimique	Très bon				

Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012

Actuellement, la définition d'une enveloppe de référence « température » pour les MER, à l'instar de ce qui a été fait dans les MEC, est impossible compte-tenu de l'absence de données "mesures en continu". Concernant l'oxygène dissous, en saison chaude, les évolutions journalières de cet indicateur montraient que ce sont essentiellement les valeurs nocturnes qui passent au-dessous du seuil "néfaste à la vie aquatique" (Cuet *et al.*, 2006). Le GT "physico-chimie et phytoplancton" DCE de la Réunion a donc jugé non pertinente la mesure de ce paramètre en journée, tel que le prévoit la DCE actuellement, dans les Masses d'Eau Récifales (MER).

Pour le paramètre nutriments, l'indicateur est défini comme étant la combinaison des indices ammonium, nitrate, nitrite, phosphate et silicate. A ce jour, en métropole, la pertinence des indices phosphate et silicate est toujours à l'étude. Ainsi, pour l'instant, l'indicateur nutriments intègre uniquement les concentrations d'azote inorganique dissous (NID), c'est à dire la somme ammonium + nitrate + nitrite. L'oligotrophie ("pauvreté nutritive") des eaux réunionnaises et les temps de résidence courts liés à un hydrodynamisme élevé au sein des Masses d'Eau, rendent les seuils proposés pour la métropole inadaptés au contexte régional. Le GT "Physico-chimie et Phytoplancton" DCE de la Réunion, en collaboration avec la Coordination Nationale Hydrologie DCE de l'Ifremer, proposeront, un indicateur nutriments adapté dès que les données en cours d'acquisition le permettront.

Les prélèvements instantanés tels que prescrits par la DCE ne permettent pas de suivre la durée et la fréquence d'éventuelles dessalures (variations de salinité). L'indicateur de qualité salinité a donc été déclaré non pertinent par les experts nationaux dans les masses d'eau côtières et de transition dans le cadre du programme de surveillance DCE. Il reste cependant un paramètre important à suivre pour son

caractère explicatif vis-à-vis d'autres éléments.

Polluants spécifiques de l'état écologique

Le GT "chimie" DCE de la Réunion (groupe de travail thématique sur les eaux littorales, associant les experts scientifiques locaux et les référents nationaux basés en métropole) a préconisé le suivi de 9 substances spécifiques "locales" utilisées à la Réunion. Il s'agit de 9 pesticides : 2,4-D, Deltaméthrine, Ethyl pyrimiphos, Fipronil, Fluroxypyr, Folpet (ou Folpel), Métazachlore, Métolachlore et Oxadiazon.

Cette liste a été définie sur :

- les recommandations formulées par la Cellule Analyse du Risque Chimique de l'Ifremer Nantes et de l'INERIS (ARC) portant sur l'adaptation de la surveillance chimique de la DCE au contexte de l'île de la Réunion (Bocquené, 2011),
- les documents réalisés par l'Ifremer concernant l'adaptation de la surveillance chimique pour la DCE conformément à la Directive fille 2008/105/CE (Claisse, 2009),
- les conclusions de différents travaux effectués dans le cadre de la DCE à la Réunion, notamment les projets portant sur les modioles (Cambert et al., 2008), les échantillonneurs passifs (Mazzellan et al., 2011 ; Gonzalez et al., 2009), l'évaluation des bruits de fond géochimiques (Chiffolleau et al., 2011), la cartographie morpho-sédimentologique (Guennoc et al., 2008 ; Turquet et al., 2008) des fonds marins (Cartomar) et l'état de référence des masses d'eaux côtières (Andral et al., 2008).
- Le suivi des substances spécifiques de l'état écologique est programmé en 2014-2015 dans le cadre du suivi des contaminants chimiques.

Polluants spécifiques de l'état écologique				
État physico-chimique	non synthétiques	synthétiques	conclusion	Molécules dégradantes
Bon	Inconnu	Inconnu	Inconnu	sans objet
Mauvais				

Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012

D. L'ETAT ECOLOGIQUE AGREGE

Conformément aux règles d'évaluation de l'état écologique des eaux au titre de la Directive Cadre sur l'Eau, l'attribution de la classe « état bon » est attribué à la masse d'eau récifale FRLC109. Le benthos de substrats durs est l'indicateur déclassant.

L'absence de données milieux (hydromorphologique) ainsi que l'absence de suivi des polluants spécifiques mais la présence d'autres données disponibles (cartomar, ...) contraignent à classer l'indice de confiance en « Moyen » (annexe 11 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 « évaluation »).

État écologique : **BON**
 Indice de confiance : **MOYEN**

État écologique	État hydromorphologique	État biologique	État physico-chimique
Très bon			
Bon			
Moyen			
Médiocre			
Mauvais			
Non défini			
Non pertinent			
État écologique	Bon		

Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012

5. ETAT ENVIRONNEMENTAL GLOBAL

L'absence, pour le moment, de cotation de l'état chimique couplé à un état écologique qualifié de « bon » aboutissent à un état environnemental « bon ». Il faut cependant nuancer ce résultat brut de part un niveau de confiance de l'état écologique « moyen » tout juste relevé par la disponibilité de données hors cadre DCE.

	État chimique	État écologique	Niveau de confiance État chimique	Niveau de confiance État écologique	
Très bon					
Bon					Elevé
Moyen					Moyen
Médiocre					Faible
Mauvais					
Non défini					Pas d'information
État global	Bon		Moyen		Niveau de confiance global

Source : projet « Bon État II », IFREMER, 2012

6. EVALUATION DES PRESSIONS ET DES IMPACTS


A. OCCUPATION DU SOL : ESPACES URBAINS, ESPACES AGRICOLES, ESPACES NATURELS

Sur le bassin-versant global de la masse d'eau FRLC_109, l'urbanisation se regroupe autour du pôle principal constitué par la ville de Saint-Pierre qui longe le littoral, et d'une partie de la ville du Tampon situé en amont.

Le littoral de la masse d'eau FRLC_109 présente une densité urbaine très élevée puisqu'il est constitué uniquement du bord de mer de Saint-Pierre.

Sur ce bassin-versant, l'agriculture est partagée entre la canne à sucre, au dessus de la ville, et l'élevage associé à des prairies permanentes dans les hauts.

Répartition des espaces agricoles, naturels et urbains sur FRLC 109 (source Corin Land Cover 2006)



B. PRESSIONS POLLUANTES PONCTUELLES ET DIFFUSES
PRESSIONS URBAINES DOMESTIQUES**Pression ponctuelle liée à l'assainissement collectif (Années de référence 2010-2011)**

Source : Base de Données sur les Eaux Résiduaires Urbaines (BDERU, DEAL)

Sur le bassin-versant, les secteurs urbains sont équipés en partie d'un système d'assainissement collectif. Néanmoins, il n'y a pas de station d'épuration se rejetant dans la masse d'eau, les dispositifs de collecte des eaux usées desservant des unités de traitement situés hors du bassin-versant de la masse d'eau.

Concernant les réseaux collectifs, ils sont majoritairement de type séparatif. Les raccordements sont souvent mal effectués et d'importants débits d'eaux parasites peuvent perturber le bon fonctionnement. L'ensemble de ces dysfonctionnements est difficile à évaluer, et il peut générer une pression significative sur les eaux côtières.

La pression est considérée comme faible.

Pression liée à l'assainissement autonome

À la Réunion, le taux de non conformité des installations autonomes est important et il est estimé à 70 %.

Les dispositifs mis en place privilégient les rejets dans le sol (parfois par puits perdus), et ils sont donc susceptibles de contribuer prioritairement à la dégradation de la qualité des eaux souterraines. Cependant, le ruissellement vers les eaux de surface est également envisageable pour partie avec alors un impact possible sur la qualité des cours d'eau et des eaux côtières.

En première approche, il est proposé d'évaluer la pression diffuse liée à l'assainissement individuel sur la base du nombre d'habitants rattachés à l'assainissement autonome.

Sur FRLC_109, la population en assainissement non collectif est estimée à 16 600 habitants (source : INSEE et DEAL 2012).

Les quantités annuelles d'azote et de phosphore rejetées dans les sols sont évaluées à :

- 55 T d'azote (NH₄) par an, soit environ 776 kg d'azote (NH₄)/km²/an
- 9 T de phosphore (PO₃) soit environ 128 kg de phosphore (PO₃)/km²/an

Cette pression est considérée comme forte.

En terme d'impact, il s'agit de quantités émises au droit des sols, et non rejetées directement dans la masse d'eau côtière. Il est difficile de quantifier les flux azotés "résiduels" se déversant vers les eaux côtières du fait notamment de la présence de phénomènes de "nitrification et dénitrification", de l'évaluation de la part qui relève de l'infiltration et du ruissellement, et des phénomènes de transfert des nitrates difficiles à appréhender.

Pression diffuse liée au ruissellement des eaux pluviales

La surface imperméabilisée (surface active) sur le bassin-versant est estimée à 540 ha soit 7,6 % du bassin versant.

Cette approche ne permet néanmoins pas d'apprécier la pression, car d'autres paramètres sont à prendre en considération : l'intensité des pluies et les types d'écoulement (diffus ou concentré), le temps de concentration, la morphologie du bassin-versant, la perméabilité des sols.

Analyse pression-impact des pollutions domestiques urbaines

Concernant les rejets d'assainissement domestique (collectifs ou individuels), les pressions exercées sont susceptibles de provoquer un enrichissement artificiel des eaux en nitrates et phosphates qui se

traduisent par des dystrophies pouvant à terme mener à des phénomènes d'eutrophisation. Ces pollutions sont parfois accompagnées de matières organiques, de macro-déchets et de bactéries fécales selon que les rejets sont ou pas connectés aux réseaux d'assainissement, et selon les performances réelles d'abattement des charges par les stations d'épuration.

La plupart des études réalisées localement montrent que les structures coralliennes de la côte ouest de l'île sont affectées de façon chronique par les enrichissements en nutriments. Il est communément admis, que l'enrichissement des eaux récifales réunionnaises, lié aux activités anthropiques, provoque une augmentation de l'abondance des peuplements algaux et créer des déséquilibres au sein des biocénoses marines (dystrophie). Les faciès algaux de pollution apparaissent principalement durant la saison chaude et disparaissent avec le retour de la saison fraîche, Cependant au cours des années une extension dans le temps et dans l'espace de ces zones est remarquée.

A l'heure actuelle, l'identification de l'origine des nutriments responsables cette dystrophie (origine agricole et/ou urbaine ?) demeure problématique. En effet, il est actuellement difficile, au regard des développements algaux constatés sur les espaces récifaux, de faire la distinction entre les effets induits par les apports d'origine agricole et ceux imputables à l'assainissement notamment autonome voire avec les effets liés aux modifications environnementales du milieu (acidification, blanchissement, maladies...).

Il a cependant été indiqué qu'une vigilance toute particulière devait être opérée sur ces apports en nutriments issus des bassins versants jouxtant la zone récifale de la côte ouest de La Réunion. Dans ce contexte des actions spécifiques devront être menées notamment dans le cadre du prochain SDAGE afin de cibler l'origine de la dystrophie constatée au niveau de cette plateforme récifale

Concernant le ruissellement urbain, outre les polluants présents dans les eaux pluviales (hydrocarbures, métaux lourds, ...), les événements pluviaux engendrent un apport terrigène vers les eaux côtières qui se traduit par le développement de panaches turbides à l'embouchure des ravines et aux exutoires de réseaux d'eaux pluviales. Si l'érosion est un phénomène naturel, en revanche elle est accélérée par les activités humaines (urbanisation, pratiques culturelles).

Notons enfin que les résurgences d'eau douce issues de la nappe phréatique peuvent également intervenir dans ces processus d'enrichissement en nutriments. L'identification des pressions responsables des dysfonctionnements qui peuvent être constatés sur l'espace récifale est ainsi complexe et les forces motrices à mobiliser afin de les juguler demeurent très difficiles à cibler.

L'espace récifale est particulièrement sensible aux apports de particules issues du ravinement des espaces terrestres lors des épisodes pluvieux. Même s'il actuellement malaisé de qualifier et quantifier l'impact de ces transferts vers les eaux récifales il faut, comme indiqué précédemment, que ces effets soient pris en compte lors du prochain exercice relevant du plan de gestion de la DCE (2016-2021).

Perspectives d'évolution des pressions urbaines d'ici 2021

Evolution de la population :

Dans les 30 ans qui viennent, à l'horizon 2040, la population réunionnaise devrait augmenter de 27 %. Le seuil du million d'habitants devrait être dépassé aux alentours de 2030, si les tendances démographiques (naturelle et migratoire) se prolongent.

L'évolution de la population sur le secteur est estimé à +15 % pour un taux d'accroissement annuel de 1,2 % (source : INSEE 2012).

Evolution de l'assainissement collectif et autonome :

La création et l'extension des réseaux de collecte des eaux usées, prévues dans le programme de mesures du SDAGE 2010-2015 et initiées par les collectivités, devraient contribuer à une évolution à la baisse de la pression potentielle liée aux dispositifs d'assainissement autonome, malgré une

densification de l'habitat et un étalement urbain prévisibles liés à l'augmentation de la population.

Enfin, la mise en place des Services Publics d'Assainissement Non Collectifs (SPANC) devrait également contribuer à une amélioration de l'impact potentiel de l'assainissement non collectif, sous réserve que les diagnostics réalisés par ces services conduisent à une réalisation effective de travaux de réhabilitation par les particuliers, sur les secteurs les plus sensibles.

Les grands projets d'aménagement

Les nouveaux projets d'aménagements intègrent les enjeux liés à l'eau (dossier loi sur l'eau avec gestion des écoulements et des eaux pluviales) et proposent des mesures réductrices ou compensatoires vis-à-vis des effets sur les masses d'eau impactées. L'impact des nouveaux projets sur la masse d'eau FRLC_109 devrait donc être non significatif sur la qualité de la masse d'eau.

La liste des projets principaux identifiés à court terme est la suivante :

Nom	Type	Commune	Impact sur la masse d'eau FRLC109
ANRU Ravine Blanche	Aménagement rénovation urbaine	Saint Pierre	Augmentation fréquentation, impact éventuel sur le trait de côte si création d'une plage
Liaison Balance / Asile Hôpital	Aménagements routiers	Saint-Pierre	Pas d'impact significatif en exploitation, impact en travaux qualité de l'eau

Source : DEAL 2012et SAFEGE 2013

PRESSIONS INDUSTRIELLES

Pression ponctuelle liée aux activités industrielles soumises à autorisation (hors élevages, entrepôts, dépôts de ferrailles, et tours aéroréfrigérées)

Concernant les installations industrielles et alimentaires classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en activité et soumises à autorisation, le tableau suivant présente les domaines d'activité concernés et une évaluation de la pression potentielle de ces sites sur la qualité de la masse d'eau côtière :

Activité	Nombre de sites	Rejets	Impact sur la masse d'eau	RSDE*
Fabrication d'autres boissons	1	GEREP et RSDE : rejet vers la station d'épuration	Pression non significative	oui

* RSDE : Campagne de recherche de substances dangereuses dans les eaux de rejet. *Source* : DEAL, 2012

Anciennes décharges

Il y a 2 anciennes décharges sur le bassin versant amont de la masse d'eau côtière. Les opérations de réhabilitation sont en cours. Pas de pression significative sur la masse d'eau côtière.

Sites et sols pollués

Il n'y a pas de site et sol pollué identifié dans la base de données BASOL sur le bassin-versant.

Autres pressions potentielles liées aux activités industrielles

Des pollutions ponctuelles ou diffuses liées aux activités industrielles non classées pour la protection de l'environnement et aux zones d'activité peuvent être émises.

Il peut s'agir de rejets ou de dépôts de déchets polluants non soumis à déclaration (fûts d'hydrocarbures, gravats, déchets divers...). Ces pressions et leurs impacts ne peuvent être connus précisément.

Perspectives d'évolution des pressions industrielles d'ici 2021

L'évolution des activités industrielles n'est pas prévisible dans le temps. Si de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement venaient à s'implanter sur le territoire, les procédures d'autorisation préfectorale permettent de s'assurer d'un impact peu significatif.

Par ailleurs, pour les ICPEs soumises à autorisation, la mise en œuvre de la campagne RSDE* (Recherche de Substances Dangereuses dans les Eaux) impose le suivi dans les rejets aqueux d'une liste de micropolluants déterminée par les activités des installations (en complément de la surveillance issue de l'étude d'impact). À La Réunion, une liste d'ICPEs prioritaires a été identifiée, et les premiers résultats sont attendus courant 2013.

Ils devraient permettre une meilleure identification des pressions polluantes potentielles et la mise en place d'un programme d'actions par l'industriel le cas échéant. Cette mesure devrait contribuer à moyen terme à une baisse de la pression potentielle de ces sites.

Analyse pression-impact :

La **pression industrielle est faible avec un impact non significatif** sur la qualité de la masse d'eau.

PRESSIONS AGRICOLES**Pression diffuse liée à l'usage des pesticides****Origine et évaluation de la pression à l'échelle du bassin de la masse d'eau côtière**

La pression liée à l'usage des pesticides peut être d'origine agricole et non agricole.


En effet, en zone urbaine, l'usage des pesticides peut présenter une pression potentielle sur la qualité de l'eau : entretien de voiries, gestion des espaces verts, utilisation par les jardiniers amateurs. Cette pression est difficilement quantifiable par manque de données à La Réunion. Elle n'a donc pas pu être évaluée.

Concernant le volet agricole, un indice de pression potentielle phytosanitaire a été affecté aux différentes familles de cultures en fonction des doses et pratiques. Ce coefficient a fait l'objet d'un dire d'expert, dans l'attente du développement de l'indice de fréquence de traitement (IFT).

Familles de cultures	IFT régional défini par famille de cultures
Canne à sucre	3,3
Maraîchage plein champs	28,0
Arboriculture fruitière	6,0
Horticulture plein champs	45,0
Prairies temporaires	1,0
Prairies permanentes	0,0

L'agriculture est très présente sur ce bassin versant. La SAU représente 47% de sa surface. Sur ce secteur, l'agriculture est dominée par la canne à sucre (38% de la SAU environ).

Le graphe ci-dessous permet une représentation de la surface des sols concernés par un usage de pesticides à l'échelle de l'aire d'extension de cette masse d'eau. La répartition de l'assolement est issue de l'exploitation des données du Recensement Agricole 2010.



La pression « pesticides » présente un IPP moyen de 2,86.

La pression est très forte.

Perspectives d'évolution de la pression

L'évolution de la Surface Agricole Utile et de l'assolement agricole n'est pas prévisible dans le temps.

Cependant, d'ici 2021, la mise en place du Plan EcophytoDOM déjà initié à La Réunion et le déploiement des mesures agri-environnementales devraient contribuer à de meilleures pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires, et une limitation du volume utilisé à l'échelle de l'île.

Analyse de la relation "pression-impact"

L'analyse « pression-impact » de la pollution diffuse pesticide sur les eaux côtières comporte de nombreuses difficultés du fait de la diversité des caractéristiques intrinsèques des molécules utilisées, de la nécessité de prise en compte des produits de dégradation, de la variabilité spatiale et temporelle des applications, des propriétés d'infiltration et de ruissellement des sols, et de l'aménagement du territoire (zones tampon, topographie, etc.), de la difficile appréciation des pratiques agricoles et non agricoles.

Sur ces bases, la masse d'eau FRLC_109 subit **une pression importante**.

La pression est forte sur cette masse d'eau, mais son impact éventuel sur la qualité des eaux côtières est considéré actuellement comme **INCONNU**.

La pression diffuse relative à l'usage des pesticides est très forte à l'échelle de la masse d'eau. Néanmoins, elle ne se traduit pas actuellement au regard des données disponibles dans le cadre de la DCE par un déclassement de la dite masse d'eau. Il faudra cependant, compte-tenu de ces éléments un suivi poussé de cette masse d'eau devra être mis en place sur ce secteur afin de caractériser l'impact potentiel des flux de polluants vers la zone récifale.

Sur ces bases, l'impact de cette de cette pression est considéré comme significatif sur l'état de la masse d'eau au titre de la Directive Cadre sur l'Eau.

Pressions liées à la présence d'élevages

Évaluation de la pression liée aux élevages

Le cheptel en place a été estimé à partir des données du Recensement Agricole 2010. Le cheptel comptabilisé sur le bassin-versant de la masse d'eau a été comparé au cheptel total à l'échelle de La Réunion.

Part du cheptel présent sur le bassin-versant			Évaluation de la pression vis à vis du cheptel total de La Réunion
Bovins	Porcins	Volailles	
13,68%	4,18%	4,49 %	Pression forte pour le cheptel "bovins"

En l'état des connaissances, il n'a pas été possible d'estimer les flux polluants générés par les élevages à l'échelle des masses d'eau, de modéliser les phénomènes de transfert de ces flux vers les eaux de surface ou vers les eaux souterraines, et d'évaluer la relation potentielle « pression-impact » des élevages sur la qualité des masses d'eau côtières.

La pression est forte sur cette masse d'eau, mais son impact éventuel sur la qualité des eaux côtières est considéré actuellement comme **INCONNU**.

C. MORPHODYNAMIQUE DU LITTORAL

La masse d'eau FRLC009 contient un site sensible à l'érosion côtière :

Site	Type de côte	Type et évolution pluridécennale de l'érosion (1966 à 2008)	Enjeux immédiat	Evolution récente (2006 à 2011)
Saint-Pierre (plage)	Plage corallienne évoluée de sable corallien	<p>Érosion de la plage</p> <p>Érosion voire disparition de certaines portions de plages (-13m de recul localement)</p> <p>Progradation de +16m liée à des rechargements artificiels</p>	Habitations et plages	-2m de perte d'épaisseur de sable dans le secteur de la Gendarmerie

Source : Morphodynamique des littoraux de la Réunion – phase 4 – BRGM, Février 2012

Les conséquences directes de l'érosion côtière concernent l'effet des mouvements sédimentaires sur les colonies coralliennes. Ils peuvent selon les cas, entraîner des phénomènes d'abrasion pouvant être associés au "déchaussement" de certaines colonies ou au contraire, des phénomènes d'hypersédimentation à l'origine d'ensablements ou d'envasements progressifs. Il en résulte à moyen terme une modification structurelle et fonctionnelle des écosystèmes, souvent associée à des mortalités massives des organismes sessiles comme les coraux.

Sur la masse d'eau FRLC_109, la pression liée au morphodynamisme des côtes est ponctuelle et relativement stabilisée. Cette pression est considérée comme faible, **sans impact significatif** sur la qualité de la masse d'eau.

D. AUTRES PRESSIONS

PRESSION PÊCHE

La masse d'eau côtière FRLC_109 s'étend de la pointe du port à la ravine Blanche, au droit du centre-ville de Saint-Pierre. Elle ne fait pas partie de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion, et la pratique de la pêche y est donc moins réglementée.

Il existe sur cette zone un port de pêche (traditionnelle et hauturière) et de plaisance pouvant accueillir 400 navires. Cependant, la nature récifale de la masse d'eau côtière FRLC_109 – Zone Récifale – Saint-Pierre ne permet pas l'exercice d'une pêche professionnelle.

Les activités de pêche à pied et de pêche embarquée y sont présentes.

Concernant les stocks, des études menées au cours des années 1980 à la Réunion révélaient une pêche récifale intense. Si on rapporte le tonnage de poisson prélevé à la superficie correspondante de récif, ce sont 40 à 45 tonnes/km²/an qui étaient extraites annuellement du récif réunionnais, soit 2 à 10 fois plus que les valeurs standard conseillées (René et Gilbert, 1999 ; Kinsey 1983 ; Cuet, 1989).

Concernant certaines espèces cibles, comme le capucin nain, il semble que le prélèvement annuel ait chuté d'un facteur 5 entre 1982 et 2000 (APMR *et al.* 2001). Depuis ces estimations, aucune étude n'a porté sur l'évolution de la tendance de la pêche récifale à la Réunion, mais l'IFREMER travaille sur la mise en place du Système d'Information Halieutique (SIH) adapté à la Réunion.

La surpêche peut avoir un impact significatif sur l'ensemble du milieu :

En effet, les herbivores sont des régulateurs essentiels du récif. Ils empêchent la prolifération algale en se nourrissant des jeunes pousses. En cas d'une pression excessive sur ces maillons, le corail, soumis aux actions de ses concurrents et compétiteurs végétaux, voit sa vitalité réduite.

Les carnivores et les omnivores ont également un rôle de régulateurs du récif. Ils assurent l'équilibre de l'écosystème en siégeant aux hautes places de la chaîne trophique. Les biomasses de tous les niveaux trophiques sont interdépendantes.

De ce fait, la pêche de petits prédateurs réduit d'autant la nourriture des grands prédateurs et ralentit leur croissance. Et la disparition des grands prédateurs récifaux favorise la pullulation de petits prédateurs opportunistes corallivores susceptibles d'infliger d'importantes dégradations aux récifs coralliens.

Une pêche intensive se traduit donc en premier lieu par une diminution de la taille des prises et, à plus long terme, par une modification de la structure trophique des peuplements de poissons, les carnivores devenant moins abondants.

Précisons également qu'au regard de la DCE en domaine marin, seule la caractérisation des masses d'eau dites de transition intègre un « indicateur poissons ». Ce type de masse d'eau n'étant pas référencée à La Réunion aucun « indicateur poissons » n'a pour le moment été initié pour les eaux marines réunionnaises.

PRESSIION AQUACULTURE

Il n'y a pas d'activité aquacole dans la masse d'eau côtière FRLC_109.

ACTIVITES NAUTIQUES ET TOURISTIQUES ET AUTRES

La ville de Saint-Pierre est l'une des communes les plus attractives et les plus touristiques de La Réunion. Elle offre un grand nombre d'activités nautiques telles que la plongée, les sports de voile et de glisse, ou le kayak de mer.

Comme les autres zones récifales de La Réunion, la masse d'eau côtière se caractérise par une biodiversité importante de coraux et de poissons coralliens qui attirent les amateurs de snorkeling.

Elle permet également des activités de plages et de baignades moins contraignantes qu'en pleine mer, et donc plus fréquentes.

La sur-fréquentation balnéaire des zones récifales peut avoir de graves impacts environnementaux (Salvat, 1998) : dégradations mécaniques, pollution du milieu, dégradations liées aux activités récréatives, prélèvements d'animaux marins, hausse de l'érosion et de la turbidité.

Le piétinement répété par les pêcheurs, les baigneurs, surtout lors des périodes d'exondation des platiers, a un impact fort sur les parties apicales des colonies coralliennes. Pour les coraux, l'impact des cassures est souvent irréversible. D'une part, la croissance des coraux est très lente, d'autre part, les cassures provoquent l'apparition de nécroses, rapidement colonisées par les algues et par les bactéries.

La présence du port de Saint-Pierre permet également la sortie d'engins motorisés comme les jetski et les petites embarcations susceptibles d'aller au-delà de la barrière de corail. Même s'il existe une passe au droit de l'embouchure de la rivière d'Abord, la fragilité du récif peut en être impactée, d'autant que les activités de plongée sous-marine s'exercent en général au niveau du platier externe de la zone corallienne.

La pression « activités nautiques et touristiques » est jugée forte mais l'impact de cette activité n'a jamais été évaluée au regard des critères de conservation et restauration de la DCE. Son impact éventuel est donc considéré aujourd'hui comme **INCONNU**.

7. RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ETAT 2021

A. EVALUATION DU RISQUE DE NON ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX (RNAOE) EN 2021

L'évaluation de la RNAOE se base sur un croisement de plusieurs analyses :

- une étude comparative des états des masses d'eau (celui de 2005 et celui qui fait l'objet de ce document),
- un scénario tendanciel de l'évolution des forces motrices sur l'aire d'alimentation des masses d'eau côtières,
- une appréciation des pressions et leurs impacts sur les masses d'eau ainsi qu'une projection évolutive de ces dernières en relation avec les mesures compensatoires ou réductrices.

Cette analyse n'est cependant pas linéaire puisque à mettre en relation avec l'évolution des connaissances qui contraint la notion de réévaluation positive ou négative d'une masse d'eau.

La masse d'eau FRLC109 présente un état écologique bon au titre de la Directive Cadre sur l'Eau.

Elle subit cependant des pressions significatives susceptibles d'impacter l'état biologique de la masse d'eau et plus précisément, l'indicateur benthos récifal de substrats durs. Les peuplements coralliens et algaux (couverture et composition) relevés sur les deux stations GCRMN de pente externe de la masse d'eau FRLC109 mettent en avant une couverture corallienne bonne et une proportion moyenne d'Acropores. L'indicateur « pente externe » est ainsi qualifié de « bon ».

Plusieurs études ont été menées ces dernières années dans le cadre de transfert de technologie vers La Réunion, avec des méthodologies identiques à celles retenues pour le suivi DCE mais sur des lieux de suivi plus proches des exutoires que les points DCE. Bien que ces résultats ne puissent être utilisés pour l'évaluation de la masse d'eau du fait de leur positionnement, ils donnent une information sur les contaminations détectées en milieu marin à La Réunion.

Le rapport PEPS fait notamment état de dépassement des NQE-MA et NQE-CMA pour plusieurs substances ou groupes de substances : Endosulfan, Hexachlorobenzène dont le Lindane et pesticides cyclodiènes et plusieurs HAP. **Pour la masse d'eau FRLC109, 2 lieux « Saint-Pierre » et « Saint-Pierre Port » ont été suivis dans le cadre de PEPS et font état de dépassement des NQE-MA et NQE-CMA pour les hexachlorobenzènes, l'endosulfan et des HAP.**

Compte-tenu de l'état actuel de la masse d'eau, de l'inventaire des pressions exercées et de leurs évolutions potentielles, et sous réserve de la mise en œuvre du programme de mesures 2010-2015, la masse d'eau FRLC109 présente un doute de non atteinte des objectifs environnementaux pour les éléments de qualité biologique et chimique.

Au vue des pressions en présence, et même si la détermination d'une force motrice responsable semble difficile, le ruissellement, l'élevage, la pêche côtière et les activités touristiques et de loisirs semblent être à l'origine des pressions pouvant avoir un impact sur le milieu.

RNAOE	Oui/Non/Doute	État de qualité susceptible d'être affecté en 2021	Causes probables
RNAOE État chimique	Doute	Qualité chimique	Détection de pesticides (endosulfan) et HAP (Benzo(g,h,i)pérylène + indéno(1,2,3-cd)pyrène)
RNAOE État écologique	Doute	Qualité biologique	Ruissellement, élevage, pêche côtière, activités touristiques et de loisirs
RNAOE global	Doute	Qualité chimique / biologique	

Fiche de synthèse

	ÉTAT	PARAMETRE EN CAUSE	NIVEAU DE CONFIANCE
ÉTAT CHIMIQUE	Inconnu	-	-
ÉTAT ECOLOGIQUE	Bon	-	Moyen
ÉTAT GLOBAL	Bon	-	Moyen

Pressions 2010-2011	Sources de pressions	Évaluation des impacts	Scénario tendanciel 2021	
		Impact	Scénario	Hypothèse
Ponctuelles significatives (SWPI3)	Stations d'épuration	Non significatif	↘	
	Installations industrielles	Non significatif		
	Autres sources significatives	Résurgences ?		
Diffuses significatives (SWPI4)	Population non raccordée au réseau d'eaux usées	Significatif ?	↘	Mise en place de SPANC, extension des réseaux collectifs
	Eaux de ruissellement Résurgences	Significatif ?	↗	Densification de l'urbanisation
	Activités agricoles	Significatif ?	↘	Mise en œuvre du plan Ecophyto
Altérations morphologiques (SWPI6)	Érosion du littoral	Non significatif		
Autres pressions (SWPI7)	Pêche	Inconnu		
	Activités nautiques et touristiques	Inconnu		

Pressions cause de risque	Assainissement autonome ?, ruissellement ?, agriculture ? ; Nutriments ?, Pesticides ?
---------------------------	--

RNAOE	Oui/Non/Doute	État de qualité susceptible d'être affecté en 2021	Causes probables
RNAOE État chimique	Doute	Qualité chimique	Détection de pesticides (endosulfan) et HAP (Benzo(g,h,i)pérylène + indéno(1,2,3-cd)pyrène)
RNAOE État écologique	Doute	Qualité biologique	Ruissellement, élevage, pêche côtière, activités touristiques et de loisirs
RNAOE global	Doute	Qualité chimique / biologique	